












# Captopril 25 mg - 50 mg

<p><b>A quoi ça sert ?</b></p>	<p>Evitez de <b>fatiguer</b> le <b>cœur</b> en limitant l'élévation de la <b>pression artérielle</b>.</p>			
<p><b>Comment le prendre ?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Deux</b> ou <b>trois</b> prises par jour</li> <li>➤ A prendre une heure avant, pendant ou après le repas et à la même heure chaque jour</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le comprimé doit être avalé avec de l'eau</li> <li>➤ Ne pas mâcher</li> <li>➤ Ne pas écraser</li> </ul>			
<p><b>Posologie usuelle</b></p>	<p>La posologie est adaptée par le médecin à intervalles réguliers.  <b>Dose de départ : 6,25 mg (1/4 de comprimé à 25mg) 3 fois par jour soit 18,75 mg par jour</b> (si patient traité par de forte dose de diurétiques ; le traitement doit être pris un jour sur deux au moment de l'initiation)  <b>Dose maximale : 50 mg 3 fois par jour soit 150 mg par jour</b></p>			
<p><b>Quels sont les effets indésirables possibles ?</b></p>	<p><b>Troubles respiratoires</b></p>		<p><i>Toux sèche persistante</i></p>	
	<p><b>Généraux</b></p>		<p><i>Maux de Tête, Vertiges, Fatigue, Etourdissements</i></p>	
	<p><b>Troubles cardiovasculaires</b></p>		<p><i>Chute de tension</i></p>	
	<p><b>Troubles digestifs</b></p>		<p><i>Vomissements, Diarrhées</i></p>	
<p><b>Conseils</b></p>	<p>En cas <b>d'oubli</b>, attendre la <b>prochaine prise</b> et ne <b>pas doubler</b> la dose.</p>			
	<p>Si <b>toux sèche</b> → bien <b>s'hydrater</b> et prévenir son médecin.</p>			
	<p>Après une <b>1<sup>ère</sup> dose</b> ou une <b>augmentation</b> de dose → <b>éviter</b> de <b>conduire</b> ou d'utiliser des <b>machines</b> durant plusieurs heures (étourdissements)</p>			
	<p><u>Contre-Indiqué</u> chez la femme <b>enceinte</b> ou <b>allaitante</b>.</p>			