











Ramipril 1,25 mg - 2,5 mg - 5 mg - 10mg

TRIA TEC®

<p>A quoi ça sert ?</p>	<p>Evite de fatiguer le cœur en limitant l'élévation de la pression artérielle.</p>			
<p>Comment le prendre ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 à 2 prises par jour ➤ Avant, pendant ou après les repas 			
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le comprimé doit être avalé avec du liquide ➤ Ne pas mâcher ➤ Ne pas écraser 			
<p>Posologie usuelle</p>	<p>La posologie est adaptée par le médecin à intervalles réguliers. Dose de départ : 2,5 mg par jour (chez les patients stabilisés sous traitement diurétique et les personnes âgées, la dose initiale recommandée est de 1,25 mg par jour.) Dose maximale : 10 mg par jour</p>			
<p>Quels sont les effets indésirables possibles ?</p>	<p>Troubles respiratoires</p>		<p><i>Toux sèche persistante</i></p>	
	<p>Généraux</p>		<p><i>Maux de Tête, Vertiges, Etourdissements</i></p>	
	<p>Troubles cardiovasculaires</p>		<p><i>Chute de tension</i></p>	
<p>Conseils</p>	<p>En cas d'oubli, attendre la prochaine prise et ne pas doubler la dose.</p>			
	<p>Si toux sèche persistante → bien s'hydrater, ne pas interrompre son traitement spontanément et prévenir son médecin.</p>			
	<p>Après une 1^{ère} dose ou une augmentation de dose → éviter de conduire ou d'utiliser des machines durant plusieurs heures (étourdissements)</p>			
	<p><u>Contre-Indiqué</u> chez la femme enceinte ou allaitante.</p>			